

DI ニュース

(Drug Information News)
 NO. 341
 2013年5月
 徳山医師会病院 薬局
 TEL:0834-31-7716
 FAX:0834-32-5349
 e-mail:yaku@tokuyamaishikai.com

薬局ホームページアドレス <http://www.tokuyamaishikai.com/yaku/index.htm>

1. お知らせ

- プラザキサカプセル110mg（ベーリンガーインゲルハイム）の効能・効果に関連する使用上の注意が新設されました。
 ～効能・効果に関連する使用上の注意～
 本剤を人工心臓弁置換術後の抗凝固療法には使用しないこと。

2. 医薬品安全対策情報

Drug Safety Update No.218(2013.4)

添付文書の改訂

★最重要と☆重要のみ当院採用薬を記載

☆カルバマゼピン(テグレート錠／ノバルティスファーマ)	
〔副作用〕の「重大な副作用」 一部改訂	「中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群）、急性汎発性発疹性膿疱症、紅皮症（剥脱性皮膚炎）： 重篤な皮膚症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、発熱、眼充血、顔面の腫脹、口唇・口腔粘膜や陰部のびらん、皮膚や粘膜の水疱、多数の小膿疱、紅斑、咽頭痛、そう痒、全身倦怠感等の異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。 また、これらの症状のほとんどは本剤の投与開始から3ヵ月以内に発症することから、特に投与初期には観察を十分に行うこと。」
☆カンデサルタンシレキセチル・ヒドロクロロチアジド(エカード配合錠HD／武田薬品) バルサルタン・ヒドロクロロチアジド(コディオ配合錠EX／ノバルティスファーマ) ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド(プレメント配合錠／MSD)	
〔副作用〕の「重大な副作用」 追記	「急性近視、閉塞隅角緑内障： 急性近視（霧視、視力低下等を含む）、閉塞隅角緑内障があらわれることがあるので、急激な視力の低下や眼痛等の異常が認められた場合には投与を中止し、速やかに眼科医の診察を受けるよう、患者に指導すること。」
☆ジヒドロコデインリン酸塩・dl-メチルエフェドリン塩酸塩・ クロルフェニラミンマレイン酸塩(フスコデ配合錠・フスコデ配合シロップ／アボットジャパン)	
〔相互作用〕 追記	「本剤に含まれるジヒドロコデインリン酸塩は、主として肝代謝酵素UGT2B7、UGT2B4及び一部CYP3A4、CYP2D6で代謝される。」

次項へ

[妊婦、産婦、授乳婦等への投与] 一部改訂	「授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。〔ジヒドロコデインリン酸塩の類似化合物（コデイン）で、母乳への移行により、乳児でモルヒネ中毒（傾眠、哺乳困難、呼吸困難等）が生じたとの報告がある。なお、CYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、母乳中のジヒドロモルヒネ濃度が高くなるおそれがある。〕」
[その他の注意] 新設	「 <u>遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、本剤に含まれるジヒドロコデインリン酸塩の活性代謝産物であるジヒドロモルヒネの血中濃度が上昇し、副作用が発現しやすくなるおそれがある。</u> 」
☆コデインリン酸塩水和物(コデインリン酸塩散1%「タケダ」・コデインリン酸塩散10%「タケダ」／武田薬品)	
[相互作用] 追記	「本剤は、主として肝代謝酵素UGT2B7、UGT2B4及び一部CYP3A4、CYP2D6で代謝される。」
[妊婦、産婦、授乳婦等への投与] 一部改訂	「授乳中の婦人には、本剤投与中は授乳を避けさせること。〔母乳への移行により、乳児でモルヒネ中毒（傾眠、哺乳困難、呼吸困難等）が生じたとの報告がある。なお、CYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、母乳中のモルヒネ濃度が高くなるおそれがある。〕」
[その他の注意] 新設	「 <u>遺伝的にCYP2D6の活性が過剰であることが判明している患者（Ultra-rapid Metabolizer）では、本剤の活性代謝産物であるモルヒネの血中濃度が上昇し、副作用が発現しやすくなるおそれがある。</u> 」

3. 新規収載医薬品

2013年4月16日薬価収載

スタリビルド配合錠	
製造・販売	日本たばこ産業
分類	内用薬：HIV-1感染症を効能・効果とする新有効成分含有医薬品・新医療用配合剤（新有効成分・新医療用配合剤）
一般名	エルビテグラビル/コビススタット/エムトリシタビン/テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩
薬価	1錠6,749.30 円
効能・効果	HIV-1感染症
用法・用量	通常、成人には1回1錠（エルビテグラビルとして150mg、コビススタットとして150mg、エムトリシタビンとして200mg及びテノホビル ジソプロキシルフマル酸塩として300mgを含有）を1日1回食事中又は食直後に経口投与する。

4. Q&Aコーナー

- ★リウマトレックスカプセルを飲み忘れた場合はどうすればよい？
飲み忘れたところは飛ばして、次回からまた通常通りに服用したのでよい。

5. 鳥インフルエンザ A (H7N9)

ここ数ヶ月、中国において鳥インフルエンザウイルス A (H7N9) に感染した患者が報告されています。厚生労働省が少し情報を出していますので載せてみたいと思います。

●鳥インフルエンザ A (H7N9) とは

今回見つかった鳥インフルエンザ A (H7N9) は、今までヒトに感染することが知られていなかったウイルスの感染症です。4月1日にWHOが中国でヒトへの感染があったことを初めて公表しました。感染源はまだわかっていませんが、中国政府の調査では、ヒトからヒトへの感染は確認されていません。

●対策・予防について

中国の発生地域に渡航される方に、この病気について注意喚起を行うとともに、不用意な動物との接触を避けるよう呼びかけています。

また、中国の発生地域からの到着時に発熱などの症状がある場合は、検疫所へ相談してください。

さらに、国内の医療機関に対して、中国から帰国後10日以内に肺炎症状等が疑われる患者を診察した場合は、保健所へ連絡するようお願いしています。

個人として、鳥インフルエンザ A (H7N9) への感染を予防するには・・・

A (H7N9) だけではなく、多くの感染症の伝播を予防するためには、衛生に気をつけるという基本的な習慣や、食品を安全に取り扱うことが必要不可欠です。

- ・食品を扱う前後およびその間、食事の前、トイレの後、動物やその排泄物に触れた後、手が汚れているときなど、頻繁に手洗いを行いましょう。家庭内に病気の人がいるときには特に入念に行いましょう。
- ・医療現場では、他の患者や医療従事者への感染を予防するためにも、手洗いは必須です。病原体は手洗いによって物理的に洗い流すことができます。またアルコール消毒も有効です（病原体を死滅させます）。
- ・咳やくしゃみをする際には、口と鼻をハンカチやティッシュで覆いましょう。
- ・高病原性の鳥インフルエンザウイルスが存在する可能性のある場所では、ウイルスのついた手指から鼻・口・結膜などにウイルスが付着するのを防ぐため、手指の衛生（手洗いとアルコール消毒剤の使用等）は非常に重要です。

現在、国立感染症研究所においては、中国CDC（疾病予防管理センター）から入手したウイルス株を用いたワクチン株の製造準備を行うなど、鳥インフルエンザ A (H7N9) の対策を進めています。

参照：厚生労働省ホームページ

