

<問い合わせ状況 2021年1月>



院外処方せんに関連する問い合わせ

当院は院外処方せんを発行しています。処方内容などに疑義が生じた場合の窓口は薬剤師となっており、月に5~10件程度の問い合わせに対応しています。1月の疑義照会は4件で、内容は以下の通りでした。



- 患者より薬剤の追加希望あり（処方追記忘れ）
- 規格、錠数の変更希望（2mg0.25錠から1mg0.5錠へ）
- 処方箋の期限切れ対応
- 併用禁忌薬あり
（主治医へ確認し、当院からの処方薬が中止となりました）



薬に関する問い合わせ（患者・家族・施設より）

患者さんやご家族、施設の方からの質問にも対応しています。1月は2件のお問い合わせがありました。

- ポルトラック®（高アンモニア血症用薬）とモビコール®（下剤）を混ぜて溶かして良いのか？

→各メーカーへ確認をしました。

ポルトラックの企業からは特に配合変化は無いとの回答を頂きましたが、モビコールの企業は試験を行っておらずデータが無いため避けてほしいとのことだったので混ぜないようにお伝えしました。

- 新しく出された薬を飲み始めてから尿が赤くなった。大丈夫だろうか？

→スタレボ®配合錠を服用開始されていました。

この薬は主成分が赤いため、尿などが着色する可能性がある薬であることをお伝えしました。



薬に関する問い合わせ（院内より）

もちろん、他部署スタッフからの質問にもお答えしています。1月は記録したもので17件でした（病棟で直接質問されたことは未記載の可能性あります）。

◎がついたものについては回答をDI ニュース No. 434 に記載しています。

- ルセフィ®の代替薬には何があるか？
- リンゼス®の薬効薬理は？
- 水を便に引き寄せるタイプの下剤は何があるか？
- シンメトレル®は採用しているか？
- ランタス XR®に近い採用薬は何があるか？
- カロナール®錠 200mg は口腔内で溶けるか？
- アンヒバ®100mg の指示が出た。当院は 200mg しかないがどうすれば良いか？

◎新レンカルボン®坐剤で血圧低下は生じるか？



- エパダール®900mg2包/日で服用している場合、当院には600mgしかないがどうすれば良いか？
- ◎プロジフ®を0.5V使用した場合の残薬は使えるか？
- カロナール®錠 300mg を服用している場合、当院には200mgと500mgしかないがどうすれば良いか？
- エバスチン®の代替薬には何があるか？
- シプロキササン®注 300mg の指示が出たが、当院にあるか？
- 院外処方せんの再発行について
- リスパダール®0.5mg錠は当院にあるか？
- ◎アジレクト®にはエフピー®が併用禁忌との記載があるがエフピー®には無い。実際はどうか？
- ◎牛乳アレルギーの子供へ乳糖は使えるか？