

## <問い合わせ状況 2022 年 10 月>




### 院外処方せんに関連する問い合わせ

当院は院外処方せんを発行しています。処方内容などに疑義が生じた場合の窓口は薬剤師となっており、月に 5 ~10 件程度の問い合わせに対応しています。10 月の疑義照会は 13 件で、内容は以下の通りでした。



- 用法用量確認 (4 件)
- 追加処方希望
- 重複処方
- 剤型・規格について (2 件)
- 中止薬・追加薬について (2 件)
- 院外処方せんの期限切れ
- その他 (2 件) : 処方箋へ医師印が無い、1 回量の表示について



### 薬に関する問い合わせ (患者・家族・施設より)

患者さんやご家族、施設の方からの質問にも対応しています。

10 月はお問い合わせが 1 件ありました。

- ファモチジン錠 10mg が 2 錠分 2 で処方されているが、朝にまとめて 2 錠服用したい。大丈夫か? →OK
- 破傷風トキソイドとインフルエンザワクチンは投与間隔が必要か? →不要



### 薬に関する問い合わせ (院内より)

他部署スタッフからの質問にもお答えしています。記録してある DI 室への問い合わせは、10 月は 10 件でした (病棟で直接質問されたことは未記載の可能性あります)

◎がついたものについては回答を DI ニュース No. 449 に記載しています。

◎シクレスト<sup>®</sup>について知りたい

- マグミット<sup>®</sup>錠を 1 回 3 錠服用は可能か? →OK
- シプロキサシン<sup>®</sup>注を希釈する際の推奨量は? →約 100mL
- エクセグラン<sup>®</sup>20%細粒 1.25g の 100mg 錠への換算は? →2.5 錠
- オルケディア<sup>®</sup>錠を半錠にできるか? →推奨しない
- 低 Na 血症の患者へバルプロ酸ナトリウムは投与可能か? →可。ただし、副作用に SIADH による低 Na 血症あり

◎ニフレック<sup>®</sup>を経管投与はできるか?

◎アルプロスタジル注を糖尿病ではない患者に使う際の使用期限は?

- アトーゼット<sup>®</sup>LD は当院採用薬だと何になるか? →アトルバスタチン 10mg とエゼチミブ 10mg

