<問い合わせ状況 2025年8月>

● 院外処方せんに関連する問い合わせ

当院は院外処方せんを発行しています。処方内容などに疑義が生じた場合の窓口は薬剤師となっており、月に5~10件程度の問い合わせに対応しています。8月の疑義照会は14件で、内容は以下の通りでした。

- 用法用量確認 (3件)
 - 日数調整 (2件)
 - 相互作用確認
 - その他：入荷しない薬について 等
- ※プロトコール対応：剤型変更4件、日数調整2件

● 薬に関する問い合わせ (患者・家族・施設より)

患者さんやご家族、施設の方からの質問にも対応しています。
8月はお問い合わせがありませんでした。

● 薬に関する問い合わせ (院内より)

他部署スタッフからの質問にもお答えしています。記録してあるDI室への問い合わせは、8月は17件でした (病棟で直接質問されたことは未記載の可能性あります)。

◎がついたものについては回答をDIニュース No. 472 に記載しています。

- 採用薬でリベルサス[®]錠の代替薬は → なし
- ◎ビーフリード[®]輸液を10歳の子へ投与可能か？
- ◎BCAAはサルコペニア予防に有効か？
- サルコペニアを予防する薬剤はあるか → 無い
- 点滴を温めて良いか？ → 問い合わせのあった薬剤の中ではメロペネムのみデータ無いため不可
- 採用薬でマイザー[®]軟膏の代替薬は？ → アンテベート[®]軟膏
- ◎ボスミン[®]外用液の代替としてボスミン[®]注は使用可能か？
- キシロカイン[®]ゼリーは油性か？ → 油性ではない
- ヴィーン[®]Dの側管からベクルリー[®]は投与可能か → データ無いため不可。ヴィーン[®]Dを止めて投与する。
- ベクルリー[®]注投与後に生食フラッシュが必要か？ → 配合変化データ無いため必要
- ◎ウロマチック[®]は加温可能か？
- ドブトレックス[®]注を一旦中止したものを再利用可能か？ → 針の二度刺しは不可
- レキサルティ[®]錠を屯用にして良いか → 頓用とするより減量を勧める
- ◎アラセナ[®]軟膏の処方上限量は？
- ロナセン[®]テープの開始用量は？ → 初回なので1枚(20mg)/日より開始
- カロナール[®] (200)を6錠/日で服用している。用量アップ可能か？ → 可
- 五苓散は3包分3で良いか → 通常であれば可